Emydura subglobosa
Category : Vrste
Published by Marijan on 03-Nov-2007 14:10

Emydura subglobosa
(KREFFT, 1876)

- Crvenotrbušna Emidura -

- Engleski naziv: Pinkbellied sideneck
- NjemaÄki naziv: Rotbäuchige Spitzkopfschildkröte
- Starost: preko 60 godina
- Velicina: do 26 cm, MuÅ¾ijaci manji
- Porijeklo: Sjeverna australija i Nova gvineja
- Hrana: Meso
- Hibernacija: Ne



Opis Vrste

Emydura subglobosa je vrsta kornjaÄe koja se u prirodi moÅ¾e naÄi na podruÄju od Australije do Nove Gvineje. Å½enke ove vrste dosegnu duÅ¾inu oklopa do 26 cm, dok muÅ¾jaci s 20 cm duÅ¾inom ostaju manji. Kao i sve vrste iz roda Chelodina i ova kornjaÄa ne uvlaÄi vrat u oklop (zbog svoje duÅ¾ine), nego ga savije na stranu. Zbog svog geografskog poloÅ¾aja ova vrsta u prirodi ne hibernira. KornjaÄe koje se po Europi nalaze u prodaji veÄinom su uzgajane u Europi, manji dio dolazi iz Nove Gvineje, dok iz Australije nema uvoza jer je tamo zakonski zabranjeno opÄenito izvoziti Å¾ivotinje. U zatoÄeništvu Å¾ivotni je vijek ove kornjaÄe i do 60 godina. Prijašni naziv ove vrste je bio "Emydura albertisii". Ako naÄete vrstu sa tim nazivom negdje u literaturi onda se radi o ovoj ovdje opisanoj kornjaÄi. U taksonomiji se Emydura subglobosa svrstava u podred Pleurodira, u familiju Chelidae i u rod Emydura.



Lijevo mlada subglobosa u usporedbi sa odraslom Å¾enkom

Tu je vrstu relativno lako uzgojiti i razmnoÅ¾iti. Emydure spolno sazrijevaju sa od prilike 6 godina. Glavno doba parenja poÄinje u rujnu. Å½enka polegne od 5 do 20 jaja, koja snese u rupu u zemlji i zatim paÅ¾ljivo zakopa. Jaja imaju duÅ¾inu od 35 do 38 mm, široka su 19 mm, teÅ¾ina iznosi oko 8 grama. Ovisno o temparaturi inkubacije, mladi se izlegnu poslije 45, najkasnije 60 dana. Tek izlegnute kornjaÄe imaju duÅ¾inu oko 30 mm i teÅ¾inu oko 5 grama.

DrÅ¾anje u zatoÄeništvu

Emyduras su dobre i relativno lagane kornjaÄe za uzgajanje. Za adekvatno drÅ¾anje paludarij nebi smio imati manje dimenzije od 150x50x50 (duÅ¾ina x širina x visina). KornjaÄe ove vrste su preteÅ¾no u vodi, no ipak je kopno neophodno kao i za sve vrste kornjaÄa iako ova vrsta dosta manje izlazi na kopno nego naprimjer Trachemys ili Chrysemys vrste. Temparatura vode mora biti, kako je veÄ navedeno, Äitavu godinu od 24 do 27°C stupnjeva, kopno mora biti 2-3 stupnja toplije što se postigne sa Å¾aruljama kao što je naprimjer "Sun Glo 100 W". Kao i kod svih kornjaÄa i ovoj kornjaÄi je potrebno UVA I UVB svijetlo, što se za slatkovodne kornjaÄe idealno postigne sa "Repti Glo 0.5" u kombinaciji sa "Repti Glo 0.2".



Odrasli primjerak Emydure subglobose u vanjskom biotopu

Text: Marijan Tunjic
Slike: Marijan Tunjic, Petra Karstedt, Iverson (Karta)