

[Infekcija uha](#)

Category : [Bolesti](#)

Published by Marijan on 12-May-2010 17:40



Infekcija uva

Infekcija uha se najčešće primeđuje ukoliko je prisutno ispuštenje u predelu uva. Infekcija dolazi kroz kanal koji spaja uvo sa Å¾drelom i najčešće se javlja u neadekvatnim higijenskim uslovima. Može da bude proprarena respiratornom infekcijom.

Nedostatak vitamina A uzrokuje promene na bubnoj opni, a materijal koji se stvara je pogodna podloga za razvoj bakterija, koje dodatno pogoršavaju situaciju i produkuju dodatno gnoj.

Infekcija može daljom progresijom da ošteti lokalne nerve i kosti.

Simptomi

- Ispuštenje u predelu uva

Uzroci

- Loša higijena smeštaja
- Smanjen imunitet
- Nedostatak vitamina A

Terapija

- Adekvatna higijena smeštaja
- Tretman nedostatka vitamina A
- Poseta veterinaru koji će zaseći bubnu opnu i očistiti srednje uvo, rana zarasta sama
- Poznati su i slučajevi gde je dolazilo do pucanja bubne opne, izbacivanja gnojnog Åžepa i zarastanja bez intervencije, ali zbog mogućih komplikacija uvek se preporučuje incizija (zasecanje) i dreniranje apcsesa.